

BESROUTE

FERTILIZANTE ORGÂNICO SIMPLES CLASSE A – TORTA VEGETAL DE SOJA

**ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO.
APÓS O USO, NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM.**

GARANTIAS E ESPECIFICAÇÕES:

Nitrogênio (N) solúvel em água	1,5% p/p (17,85 g/L)
Carbono orgânico Total	11,0% p/p (130,9 g/L)

MATÉRIA PRIMAS: TORTA VEGETAL DE SOJA, ÁGUA.
MAIOR RELAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE: 1000 ML.L⁻¹
DENSIDADE: 1,19 G.ML⁻¹

**PRODUTO REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA SOB O Nº RS 006502-1.000004**

NATUREZA FÍSICA DO PRODUTO: FLUIDO



CONTEÚDO: **20L**

Nº DO LOTE:
DATA DE FABRICAÇÃO:
DATA DE VENCIMENTO:

PRAZO DE VALIDADE:
QUANTIDADE PRODUZIDA POR LOTE:

FERTILIZANTE ORGÂNICO SIMPLES CLASSE A – TORTA VEGETAL DE SOJA PARA APLICAÇÃO VIA FOLIAR E VIA SOLO

CARACTERÍSTICAS

BESROUTE é um fertilizante orgânico simples de torta vegetal de soja classe A para aplicação foliar e no solo com nitrogênio e carbono. O nitrogênio contido no BESROUTE, ao ser absorvido pela planta, é incorporado através de moléculas como aminoácidos, elementos estruturais de proteínas e responsáveis por inúmeros processos fisiológicos na planta. Devido a esta característica, a aplicação de BESROUTE é recomendada em estados de crescimento ativo das plantas. O teor de carbono do BESROUTE torna o produto uma alternativa interessante na ativação da microbiota do solo.

MODO DE USO

Agitar vigorosamente a embalagem do produto, antes de usá-lo, realizando uma mistura homogênea. O uso do produto é exclusivo como fertilizante.

ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES DE USO

Armazenar em sua embalagem original, em lugares frescos e secos mantendo-o fora do alcance de crianças e animais. Mantenha o produto ao abrigo da luz em temperatura de 0 a 35 °C. Evitar as aplicações em condições climáticas extremas (condições de seca, elevada umidade relativa do ar, geada ou chuva). Lave todos os equipamentos de aplicação antes e depois de seu uso.

MODO DE USO

Empilhamento máximo: 4.

CUIDADOS

Leia o rótulo e siga rigorosamente as instruções de uso. Em caso de dúvidas, solicite orientações de engenheiro agrônomo. Utilize roupas de proteção, luvas, óculos de proteção e protetor facial. Evite o contato direto com a pele, olhos e roupas. Lave bem as mãos após o manuseio do produto. Evite inalar spray ou poeira proveniente do produto. Manter o produto em local bem ventilado, em sua embalagem original, longe da luz solar direta. Armazene o produto longe do alcance de crianças, animais e alimentos.

INCOMPATIBILIDADE

Pode ser aplicado na forma de mistura em tanque com outros fertilizantes, mas é recomendado realizar um teste de mistura antes do uso. Testes de compatibilidade e testes biológicos em pequenas áreas são necessários antes da mistura com pesticidas.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	MODO DE APLICAÇÃO	DOSAGENS	RECOMENDAÇÕES
Soja, Girassol, Feijão	Foliar	0,5 – 1 L/ha	25 dias após a semeadura e repetir se necessário. Aplicar no início da floração e fixação.
Milho, Sorgo	Foliar	0,5 – 1 L/ha	Aos 30 dias após a semeadura.
Trigo, Arroz	Foliar	Foliar	Aos 30 dias após a semeadura e no início da floração ou panícula.
Hortaliças	Foliar e Solo	1-2 L/ha	20 dias após a semeadura e repetir após 20 dias. Pode ser repetido em caso de estresse ou toxicidade.
Citros	Foliar	1-2 L/ha	Na queda de pétalas pré-floração, frutificação e preenchimento de frutos.
Cana-de-açúcar	Foliar	0,8 – 1,5 L/ha	Em cana-soca aplicar 40 dias após o corte. Na folha da cana, aplicar 30 e 50 dias após a semeadura.

DILUIÇÃO(L/água): 1000-1500L

As dosagens são apenas indicativas e podem variar devido ao clima e condições de solo.

Importado por:

RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.
REGISTRO ESTABELECIMENTO MAPA nº EI: RS 006502-1
CNPJ: 10.486.463/0001-69
Avenida Carlos Gomes nº 258 – salas 1103/1106 – Boa Vista –
Porto Alegre/RS – CEP. 90.480-000
Tel / Fax: (51) 3237-6414
Endereço eletrônico: www.rainbowagro.com.br
e-mail: rainbowbrasil@rainbowagro.com

Produzido por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Endereço: 03001 LUJIAN ROAD, BINHAI
ECONOMIC
DEVELOPMENT AREA
WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE - China