

SEARENT

FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A

**ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO.
APÓS O USO, NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM.**

GARANTIAS E ESPECIFICAÇÕES:

Óxido de Potássio (K ₂ O) solúvel em água	18,0% p/p
Nitrogênio (N) solúvel em água	1,0 % p/p
Carbono orgânico Total	14,0% p/p
Zinco (Zn) solúvel em água	0,5% p/p
Boro (B) solúvel em água	0,5% p/p

MATÉRIA PRIMAS: EXTRATO DE ALGAS, SULFATO DE POTÁSSIO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, ÁGUA.

MAIOR RELAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE: 1000 G.L⁻¹

**PRODUTO REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA SOB O Nº RS 006502-1.000003**

NATUREZA FÍSICA DO PRODUTO: SÓLIDO

CONTEÚDO: **20KG**

Nº DO LOTE:
DATA DE FABRICAÇÃO:
DATA DE VENCIMENTO:

PRAZO DE VALIDADE:
QUANTIDADE PRODUZIDA POR LOTE:

FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A PARA APLICAÇÃO VIA FOLIAR E VIA SOLO

CARACTERÍSTICAS

SEARENT é um fertilizante orgânico organomineral com alta concentração de Potássio (K₂O) para aplicação foliar e no solo. O aporte da nutrição potássica do SEARENT torna-o uma excelente alternativa para aplicação nas fases de floração e crescimento de vagens e frutos, promovendo o seu enchimento. As altas concentrações de Carbono, Zinco e Boro promovem aos solos um ambiente melhor para a proliferação da microbiota benéfica.

MODO DE USO

Misturar com água de acordo com a dosagem utilizada. O uso do produto é exclusivo como fertilizante.

ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES DE USO

Armazenar em sua embalagem original, em lugares frescos e secos mantendo-o fora do alcance de crianças e animais. Mantenha o produto ao abrigo da luz em temperatura de 0 a 35° C. Evitar as aplicações em condições climáticas extremas (condições de seca, elevada umidade relativa do ar, geada ou chuva). Lave todos os equipamentos de aplicação antes e depois de seu uso.

TRANSPORTE

Empilhamento máximo: 4.

CUIDADOS:

Leia o rótulo e siga rigorosamente as instruções de uso. Em case de dúvidas, solicite orientações de um engenheiro agrônomo. Utilize roupas de proteção, luvas, óculos de proteção e protetor facial. Evite o contato direto com a pele, olhos e roupas. Lave bem as mãos após o manuseio do produto. Evite inalar spray ou poeira provenientes do produto. Manter o produto em local bem ventilado em sua embalagem original, longe da luz solar direta. Armazene o produto longe do alcance de crianças, animais e alimentos.

INCOMPATIBILIDADE

Pode ser aplicado na forma de mistura em tanque com outros fertilizantes, mas é recomendado realizar um teste de mistura antes do uso. Testes de compatibilidade e testes biológicos em pequenas áreas são necessários antes da mistura com pesticidas.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	MODO DE APLICAÇÃO	DOSAGENS	RECOMENDAÇÕES
Soja, Girassol, Feijão	Foliar	0,2– 1 Kg/ha	25 dias após a semeadura e repetir se necessário. Aplicar no início da floração e fixação.
Milho, Sorgo	Foliar	0,2– 1 Kg/ha	30 dias após a semeadura.
Trigo, Arroz	Foliar	0,2– 1 Kg/ha	30 dias após a semeadura e no início da floração ou panícula.
Hortaliças	Foliar e Solo	0,5 – 2 Kg/ha	20 dias após a semeadura e repetir após 20 dias. Pode ser repetido em caso de estresse ou toxicidade.
Citros	Foliar	0,5 – 2 Kg/ha	Na queda de pétalas pré-floração, frutificação e preenchimento de frutos.
Cana-de-açúcar	Foliar	0,2– 1 Kg/ha	Em cana soca aplicar 40 dias após o corte. Na folha da cana, aplicar 30 e 50 dias após a semeadura.

DILUIÇÃO (L/água): 800-1000L

As dosagens são apenas indicativas e podem variar devido ao clima e condições de solo.

Importado por:
RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.
REGISTRO ESTABELECIMENTO MAPA nº EI: RS 006502-1
CNPJ: 10.486.463/0001-69
Avenida Carlos Gomes nº 258 – salas 1103/1106 – Boa Vista – Porto Alegre/RS – CEP: 90.480-000
Tel / Fax: (51) 3237-6414
Endereço eletrônico: www.rainbowagro.com.br
e-mail: rainbowbrasil@rainbowagro.com

Produzido por:
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL CO., LTD.**
Endereço: 03001 LUJIAN ROAD, BINHAI
ECONOMIC
DEVELOPMENT AREA
WEIFANG CITY, SHANDONG
PROVINCE - China